

能食而欲吐。脘腹瀉黃。而發亦疏。  
此症治法最難。故宜小心診察。辨明虛實。雖不致傷矣。  
治法。如滿者宜梔子中黃湯。虛者。宜香薷解醒湯。如茵陳  
湯。心滿不食或心中懊憹。小便黃赤者。宜常潯白朮湯。  
(即白朮茯苓甘草茵陳甘草半夏杏仁枳實前胡生薑)。如  
大便秘者。改用茵陳蒿湯。如變成腹脹。漸至身面俱黃  
腫者。急宜培土養香扶脾丸。(即厚朴甘草半夏陳皮木  
香麥芽生薑大棗等爲丸)飯湯送服。然疸症之病。如不  
早圖治。日久月深。血中之毒質。隨毒氣以變黑色。爲  
黑疸病。治法尤難。宜梔子大黃湯。合犀角地黃湯。解  
血中毒質。甚者如桃仁川山甲。入血分解毒。散瘀爲妙

本報特聘 徐元誥 大律師 爲常年法律顧問  
電話 北京路四十六號  
事務所 北京路四十六號  
衡大律師 爲常年法律顧問  
電話 中央八九四六號

粒隱於肉內。不得外出。乃由火毒鬱結。肌膚爲熱所煎灼。血液受火毒之焦灼。皮膚閉塞。故火毒不得外洩。此候如不重用大劑涼下。通其腑氣。解其肌熱。則未有不致死者。治法如下。

生石膏四兩。烏犀角一錢。(磨沖)。羚羊尖六分。(磨沖)。鮮生地一兩。鮮石斛一兩。上川連二錢。生黃芩三錢。生梔子五錢。生大黃三錢。(無食積。若不黃膩者。減量。用一錢或二錢。)(銀花一兩。連翹五錢。活水蘆芽五兩。熬水煎藥)。鮮竹葉三十片。(爲引)。

竹葉三十片。(爲引)。

此方服後。則必大瀉。所瀉之糞。有如黑膏。惡臭觸鼻。一瀉之後。則高熱必退。肌膚不爲熱毒所灼。痘毒反而起發。以後再減大黃照服二劑。其他各藥分量。至二三服可以酌減。惟生石膏。必至九朝後再減。防其熱勢復來。否則不救矣。而石膏必須用生者。熟者不獨無用。反致誤事。切記。

(一) 身必癢 (二) 天麻

(三) 朱丹溪 (四) 甘草

猜中者已將贈品發出矣

(三)種痘之歷史

種痘之法。始於宋朝。取痘兒之漿。收入棉花。納於鼻孔。男左女右。若不得漿。或以痘痂。或以痘兒新發之衣。與他兒服之。蓋舊時人民。見已種者。不獨得症較輕。且能免天痘之危險。是以兒生數月。或數年。即依法種痘。我國初於。印度繼於後。迨西歷一千七百二十一年。英國女子孟脫卡。Worth Montagu 始傳此法於其國。在都市流行。然種後發症極重。與天痘無異。甚則有生命之虞。卽幸而獲痊。面部已瘡痕難點。不復如昔時之溫潤如玉矣。

當生痘未發開時。人民因痘症傳染神速。誤治又難。故卽不知者。亦莫不注意。且社會上視為極重要之問題。後有人見牛之乳頭。生有發生痘瘡。漸而注大。且生漿修痂。與人痘無異。採牛乳者。偶染其漿。亦發生同樣之痘。後卽遇天痘。亦無傳染之患。有二教員。名好爾可與戴來脫者。已種痘。已於一千七百九十一年。取牛痘漿。爲三兒種之。預防天痘傳染。至一千七百九十八年愛爾氏 Edward Jenner 讀二十載之經驗。種牛痘法。始見實行。推行各國。種後發症輕微。從無危及生命者。與古時種痘之法相較。甘饒勝不可以道里計矣。

(未完)

甲	特診二元	食料病室	門診上	掛號
乙	門診一元	普通追加	午九時	電話
丙	出診四元	至下午	四時止	六號
丁	膏丸方四元	大日取件	一弄第	三號
戊	急病隨請到	出診時	一家	處

秘儀署

實驗得來之腫腹良方	痘痘指南	(陳魯珍)
酒疸之研究	因隱方	(郭志道)
小兒痘症毒重灼熱不起治	消汗方	(劉人)
癰疽	簡易消汗法	(前人)
百病指南	婦女經閉成勞方	(秦伯未)
軍醫生活記	黃水瘡方	(前人)
(余不平)		

## 介紹新書

醫士葉雅和近龍現代名醫醫案第一集。現已出版。內容頗多發聞。不同人云亦云。再冊大洋一元。本館均有代售。



閃腰方  
(郭志道)

消疔方

（無論如何危險均能奏  
杜宇麝香三厘。上雄黃三

口簡易消療法（前）

途健婦指痛疾婦解  
徑康女導苦病女決

高明辨症  
心理治病  
實驗退病  
本美容  
氣自癒  
崩急救  
帶靈效  
藥治症

(楊舒榮)

---

(十一)

10

10

會。文。什。上。的。晨。想。一。總。

(張治河)

調

大稿現已告罄。

本兩  
言由  
柳等  
治療  
一元

。慢  
(須  
醫學  
治本  
醫單  
水氣  
近功  
結何  
原因

### 症狀

(李健頤)

100